



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Višja raven

MATEMATIKA

==== Izpitna pola 1 ====

- B) Krajše strukturirane naloge
C) Strukturirane naloge

Sobota, 5. junij 2021 / 90 minut (45 + 45)

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prinese nalično pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko in geometrijsko orodje (šestilo in ravnilo, lahko tudi trikotnik)

in računalo.

Priloga s formulami in konceptna lista so na perforiranih listih, ki jih kandidat pazljivo iztrga.

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.

Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Pri reševanju te izpitne pole uporaba računala ni dovoljena.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani).

Izpitsna pola je sestavljena iz dveh delov, dela B in dela C. Časa za reševanje je 90 minut. Priporočamo vam, da za reševanje dela B porabite 45 minut, za reševanje dela C pa 45 minut.

Izpitsna pola vsebuje 6 krajših strukturiranih nalog v delu B in 2 strukturirani nalogi v delu C. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 60, od tega 40 v delu B in 20 v delu C. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate s standardno zbirko zahtevnejših formul na straneh 3 in 4.

Rešitve pišite z naličnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v za to predvideni prostor **znotraj okvirja**. Rišete lahko tudi s svinčnikom. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisni in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Strani 15 in 20 sta rezervni; uporabite ju le, če vam zmanjka prostora. Jasno označite, katere naloge ste reševali na teh straneh. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 20 strani, od tega 2 rezervni.



M 2 1 1 4 0 2 1 1 0 2



Formule

(Vsota in razlika potenc z naravnim eksponentom) Za poljubna $a, b \in \mathbb{R}$ in za poljubno naravno število n velja

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a+b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + a^{2n-2}b^2 - \dots + a^2b^{2n-2} - ab^{2n-1} + b^{2n}),$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

(Evklidov in višinski izrek) Pravokotni trikotnik ima kateti a in b ter hipotenuzo c . Višina na hipotenuzo je v_c , pravokotna projekcija katete a na hipotenuzo je a_1 , pravokotna projekcija katete b na hipotenuzo pa b_1 . Tedaj velja $a^2 = ca_1$, $b^2 = cb_1$, $v_c^2 = a_1b_1$.

(Polmera trikotniku včrtanega in očrtanega kroga) Trikotnik ima stranice a, b in c , polovica obsega

$$\text{je } s = \frac{a+b+c}{2}, \text{ ploščina je } S, \text{ polmer danemu trikotniku včrtanega kroga je } r \text{ in polmer}$$

$$\text{danemu trikotniku očrtanega kroga je } R. \text{ Tedaj je } r = \frac{S}{s} \text{ in } R = \frac{abc}{4S}.$$

(Heronova formula) Trikotnik ima stranice a, b in c , polovica obsega je $s = \frac{a+b+c}{2}$. Tedaj je

$$\text{njegova ploščina } S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

(Ploščina trikotnika) Naj bodo $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ in $C(x_3, y_3)$ točke v ravnini. Ploščina trikotnika z

$$\text{oglišči } A, B \text{ in } C \text{ je enaka } S = \frac{1}{2}|(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|.$$

(Krogla) Površina in prostornina krogle s polmerom r sta $P = 4\pi r^2, V = \frac{4\pi r^3}{3}$.

(Razdalja točke od premice) Naj bodo $a, b, c, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ in naj a in b ne bosta oba enaka 0.

Razdalja točke $T_0(x_0, y_0)$ od premice p , podane z enačbo $ax + by - c = 0$, je

$$d(T_0, p) = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

(Logaritem) Naj bosta $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$. Tedaj za vsak $x > 0$ velja $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

(Adicijski izreki) Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y, \quad \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y.$$

Za poljubna $x, y \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k; k \in \mathbb{Z} \right\}$, za katera je $x + y \neq \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k$ za poljuben $k \in \mathbb{Z}$ in

$$\tan x \tan y \neq -1, \text{ velja } \tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}.$$

(Kotne funkcije polovičnih kotov) Za poljuben $x \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \quad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}.$$

$$\text{Za poljuben } x \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + \pi \cdot 2k; k \in \mathbb{Z}\} \text{ velja } \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}.$$

(Faktorizacija vsote in razlike kotnih funkcij) Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cos \frac{x \mp y}{2},$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2},$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$$



(Razčlenitev produkta kotnih funkcij) Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}(\cos(x+y) - \cos(x-y)),$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y)),$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)).$$

(Elipsa) Elipsa v ravni ima polosi a in b ($a > b$), njena linearna ekscentričnost je e , njena

numerična ekscentričnost je ε . Tedaj velja $e^2 = a^2 - b^2$, $\varepsilon = \frac{e}{a}$.

(Hiperbola) Hiperbola v ravnini ima realno polos a in imaginarno polos b , njena linearna

ekscentričnost je e , njena numerična ekscentričnost je ε . Tedaj velja $e^2 = a^2 + b^2$, $\varepsilon = \frac{e}{a}$.

(Parabola) Parabola v ravni z enačbo $y^2 = 2px$ ima gorišče v $G\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, enačba premice vodnice

dane parabole pa je $x = -\frac{p}{2}$.

(Aritmetično zaporedje) Vsota prvih n členov aritmetičnega zaporedja (a_n) je $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$.

(Geometrijsko zaporedje) Vsota prvih n členov geometrijskega zaporedja (a_n) s kvocientom $q \in \mathbb{R}$

je $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$, če je $q \neq 1$, in $S_n = na_1$, če je $q = 1$.

$$(\text{Limiti}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad \text{in} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(Nedoločeni integral) Naj bo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tedaj je za vsak $C \in \mathbb{R}$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad \text{in} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.$$

(Integralacija po delih) Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$ in $u, v : D \rightarrow \mathbb{R}$ odvedljivi funkciji. Tedaj velja

$$\boxed{\int u \cdot v' = u \cdot v - \int v \cdot u'}.$$

(Volumen rotacijskega telesa) Naj bo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Volumen telesa, ki ga dobimo tako, da lik, ki ga omejujejo graf funkcije f , abscisna os ter premici $x = a$ in $x = b$, zavrtimo

okrog abscisne osi za 360° , je $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

(Bernoullijeva formula) Naj bo p verjetnost, da se v danem poskusu zgodi dogodek A . Verjetnost, da se dogodek A v n zaporednih ponovitvah poskusa zgodi natanko k -krat, je

$$P(n, p, k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



M 2 1 1 4 0 2 1 1 0 5

5/20

Konceptni list



Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



7/20

Konceptni list



Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



M 2 1 1 4 0 2 1 1 0 9

B) KRAJŠE STRUKTURIRANE NALOGE

1. Brez uporabe računala rešite enačbi

$$7^{x-2} = \sqrt{7}$$

in


$$\log_7(\sqrt{11} - x) + \log_7(\sqrt{11} + x) = 1.$$

(6 točk)



2. Dana je funkcija f s predpisom $f(x) = \begin{cases} 1; & x > -1 \\ x+2; & x \leq -1 \end{cases}$.


V ravnilo, opremljeno s koordinatnim sistemom, narišite graf funkcije f . V isti koordinatni sistem narišite premico z enačbo $y = x$.



V koliko točkah seka premica z enačbo $y = x$ graf funkcije f ? Poiščite vsa realna števila k , za katera seka premica z enačbo $y = k \cdot x$ graf funkcije f natanko dvakrat. Pomagajte si z grafom.

(5 točk)

3. Slika prikazuje elipso s temeni A , B , C in D . Zapišite gorišči te elipse. Zapišite tudi enačbo krožnice, ki ima središče v točki B in poteka skozi izhodišče koordinatnega sistema.



(8 točk)



4. V aritmetičnem zaporedju s splošnim členom a_n velja: $a_2 + a_4 = 26$ in $a_3 + a_5 = 34$. Izračunajte vsoto prvih 50 členov tega zaporedja.

(7 točk)



5. Zapišite predpis kvadratne funkcije, ki ima pri $x = 1$ ekstremno vrednost 4 in ničlo $x_1 = 3$.

(7 točk)



6. Za funkcijo f velja $f(0) = 2021$ in $f'(x) = e^{-x} + 3x^2$ za vsak $x \in \mathbb{R}$. Zapišite predpis funkcije f . Izračunajte tudi $f'(1)$.

(7 točk)



Rezervna stran

OBRNITE LIST.

**C) STRUKTURIRANE NALOGE**

1. Naj bo funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ podana s predpisom $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$.
 - 1.1. Zapišite enačbo normale na graf funkcije f , ki je vzporedna premici z enačbo $x - y - 3 = 0$.
(4 točke)
 - 1.2. Izračunajte ploščino omejenega območja, ki ga omejujeta graf funkcije f in premica z enačbo $x - y - 1 = 0$.
(4 točke)
 - 1.3. Naj bo $g : [2, \infty) \rightarrow \left(-\infty, \frac{7}{2}\right]$ funkcija s predpisom $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$. Ali je funkcija g surjektivna? Odgovor utemeljite.
(2 točki)

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.




M 2 1 1 4 0 2 1 1 1

17/20



2. Dane so množice $A = \{z \in \mathbb{C}; |z - 1| = 2\}$, $B = \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re}(z) = 2\}$ in $C = \{z \in \mathbb{C}; z^2 + \bar{z}^2 = 2\}$.

2.1. Narišite množici A in B v kompleksni ravnini, opremljeni s koordinatnim sistemom, ter izračunajte ploščino pravokotnika, katerega ena stranica leži na imaginarni osi, dve izmed njegovih oglišč pa sta elementa množice $A \cap B$.



(5 točk)

- 2.2. Dokažite, da je krivulja, ki jo predstavlja množica C , hiperbola.

(2 točki)

- 2.3. Izračunajte, v kateri točki na krivulji z enačbo $x^2 - y^2 = 1$ ima tangenta na dano krivuljo enačbo $y = -\sqrt{2}x + 1$.

(3 točke)

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



M 2 1 1 4 0 2 1 1 1 1 9

19/20



Rezervna stran

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.