



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

**Osnovna raven**  
**MATEMATIKA**  
Izpitna pola 1

**Sobota, 6. junij 2020 / 120 minut**

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, računalo in geometrijsko orodje (šestilo in dva trikotnika, lahko tudi ravnilo).

Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.

**SPLOŠNA MATURA**

**NAVODILA KANDIDATU**

Pazljivo preberite ta navodila.

**Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec). Svojo šifro vpišite tudi na konceptna lista.

Izpitna pola vsebuje 12 kratkih nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 80. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate s standardno zbirko zahtevnejših formul na strani 3.

Rešitev, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v **izpitno polo** v za to predvideni prostor. Rišete lahko tudi s svinčnikom. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Stran 16 je rezervna; uporabite jo le, če vam zmanjka prostora. Jasno označite, katere naloge ste reševali na tej strani. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni.

Zaupajte vase in svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 16 strani, od tega 1 rezervno.



M 2 0 1 4 0 1 1 1 0 2



## Formule

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots + a^2b^{n-3} - ab^{n-2} + b^{n-1}), \text{ če je } n \text{ liho naravno število}$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}), \text{ če je } n \in \mathbb{N}$$

Evklidov in višinski izrek v pravokotnem trikotniku:  $a^2 = ca_1$ ,  $b^2 = cb_1$ ,  $v_c^2 = a_1b_1$

Polmera trikotniku očrtanega in včrtanega kroga:  $R = \frac{abc}{4S}$ ,  $r = \frac{S}{s}$ ,  $s = \frac{a+b+c}{2}$

Kotne funkcije polovičnih kotov:

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{2}, \quad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1+\cos x}{2}, \quad \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$$

Adicijski izrek:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

Faktorizacija:

$$\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cos \frac{x \mp y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \quad \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\tan x \pm \tan y = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos x \cos y}$$

Razčlenitev produkta kotnih funkcij:

$$\sin x \sin y = -\frac{1}{2} [\cos(x+y) - \cos(x-y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

Razdalja točke  $T_0(x_0, y_0)$  od premice  $ax + by - c = 0$ :  $d(T_0, p) = \left| \frac{ax_0 + by_0 - c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$

Ploščina trikotnika z oglišči  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ :

$$S = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|$$

Elipsa:  $e^2 = a^2 - b^2$ ,  $\varepsilon = \frac{e}{a}$ , če je  $a > b$

Hiperbola:  $e^2 = a^2 + b^2$

Parabola:  $y^2 = 2px$ , gorišče  $G\left(\frac{p}{2}, 0\right)$

Kompozitum funkcij:  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$


Bernoullijeva formula:  $P(n, p, k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Integral:  $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$



1. V preglednici so podane funkcije. K vsaki funkciji zapišite črko grafa, ki ji ustreza (glejte rešeni primer).

Funkcija	Graf (zapišite črko, ki označuje graf funkcije)
$f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$	H
$f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^{-1}$	
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2$	
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2^x$	
$f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^{-2}$	
$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_2 x$	
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$	



(6 točk)



V sivo polje ne pišite.

2. Vsota dveh števil je enaka 5661. Drugo število je za 22 % vrednosti prvega števila večje od prvega števila. Izračunajte obe števili.

(5 točk)




3. Skicirajte pravokotnik  $ABCD$  in poltraka s skupnim izhodiščem v oglišču  $A$ , ki razpolavlja vsak po eno od stranic  $BC$  in  $CD$ . Izračunajte kot  $\varphi$  med danima poltrakoma, če je  $|AB| = 6\text{ cm}$  in  $|AD| = 4\text{ cm}$ .

(5 točk)



V sivo polje ne pišite.

4. Dana je kvadratna funkcija  $f$  s predpisom  $f(x) = -2x^2 - 4x$ . Izračunajte ničli dane funkcije, izračunajte teme in narišite graf. Zapišite vse vrednosti  $x$ , za katere je  $f(x) > 0$ . Na katerem intervalu je funkcija naraščajoča? Zapišite največji tak interval. Rešite enačbo  $f(x) = -10$ . Nalogo rešite brez računala.



(8 točk)



5. Brez uporabe računala rešite enačbi:

5.1.

$$9^{x-3} = 3\sqrt{3}$$

(3)

5.2.

$$\log_{\frac{1}{5}}(3x-2) = -2$$

(3)  
(6 točk)



M 2 0 1 4 0 1 1 1 0 9

V sivo polje ne pišite.

6. V kvadratu z oglišči  $A, B, C, D$  in stranico dolžine  $a$  je točka  $P$  razpolovišče stranice  $CD$ . Točka  $T$  leži na stranici  $BC$  tako, da je  $|BT| : |TC| = 1 : 3$ . Narišite skico. Z vektorjema  $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$  in  $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$  izrazite vektorja  $\overrightarrow{AT}$  in  $\overrightarrow{AP}$ . Preverite, da je skalarni produkt vektorjev  $\overrightarrow{AT}$  in  $\overrightarrow{AP}$  enak  $\frac{3}{4}a^2$ .

(7 točk)




7. Naj bo  $a \in \mathbb{Z}$ . Vrednost izraza  $(1 - \sin x)^2 + \cos^2 x - 2$  je enaka vrednosti izraza  $a \cdot \sin x$  za vsak  $x \in \mathbb{R}$ . Izračunajte  $a$ . Za katere  $x \in \mathbb{R}$  je vrednost tega izraza enaka 1?

(6 točk)



V sivo polje ne pišite.

8. Na sliki sta narisani krožnica  $K$  in premica  $p$ .



- 8.1. Zapišite enačbi narisanih krivulj.

(3)

- 8.2. Izračunajte ploščino manjšega krožnega odseka, ki ga omejujeta premica  $p$  in krožnica  $K$ .

(4)  
(7 točk)



9. Funkcija  $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  ima predpis  $f(x) = \frac{1}{x^2} - 2\cos x + e^{3x}$ .

9.1. Izračunajte odvod funkcije  $f$ .

(3)

9.2. Izračunajte nedoločeni integral funkcije  $f$ .

(3)  
(6 točk)



V sivo polje ne pišite.

10. Dana so zaporedja s splošnimi členi  $a_n = \frac{3n}{2n+1}$ ,  $b_n = 2^n + 1$  in  $c_n = 3^{-n}$ .

10.1. Dokažite, da je zaporedje s splošnim členom  $a_n$  omejeno.

(3)

10.2. Dokažite, da je zaporedje s splošnim členom  $b_n$  naraščajoče.

(3)

10.3. Izračunajte  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  in  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ .

(2)  
(8 točk)



11. Dane so števke 1, 2, 3, 4 in 7.

11.1. Iz danih števk naključno sestavimo trimestrno število, pri katerem se števke lahko ponavljajo. Kolikšna je verjetnost, da sestavimo število, ki je deljivo s 4?

(4)

11.2. Iz danih števk naključno sestavimo trimestrno število, pri katerem se števke ne smejo ponavljati. Kolikšna je verjetnost, da sestavimo število, ki je deljivo s 3?

(4)  
(8 točk)



V sivo polje ne pišite.

12. V pravilni štiristrani piramidi je stranska višina  $v_1$  za 4 cm daljša od višine piramide  $v$ . Izračunajte dolžino osnovnega roba piramide, če meri njena prostornina  $22 \text{ cm}^3$ . Nalogo rešite brez uporabe računalna.

(8 točk)



REZERVNA STRAN

V sivo polje ne pišite.