



Š i f r a k a n d i d a t a :
A j e l ö l t k ó d s z á m a :

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK

Višja raven
Emelt szint
MATEMATIKA

==== Izpitna pola 1 ====
1. feladatlap

- B) Krajše strukturirane naloge / Rövidebb strukturált feladatok
C) Strukturirane naloge / Strukturált feladatok

Sobota, 8. junij 2024 / 90 minut (45 + 45)
2024. június 8., szombat / 90 perc (45 + 45)

Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko in geometrijsko orodje (šestilo in ravnilo, lahko tudi trikotnik).

Priloga s formulami in konceptna lista so na perforiranih listih, ki jih kandidat pazljivo iztrga.

Engedélyezett segédeszközök: A jelölt töltőtollat vagy golyóstollat, ceruzát, radírt, rajzeszközöket (körzőt és vonalzó, esetleg háromszöget).

A képleteket tartalmazó lap és a vázlatkészítéshez mellékelt lap perforált, ezeket a jelölt óvatosan kiszakíthatja.

SPLOŠNA MATURA
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Navodila kandidatu so na naslednji strani.
A jelöltnak szóló útmutató a következő oldalon olvasható.

Ta pola ima 24 strani, od tega 2 prazni in 2 rezervni.
A feladatlap 24 oldalas, ebből 2 üres és 2 tartalék.



NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.

Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Pri reševanju te izpitne pole uporaba računalna ni dovoljena.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na prvi strani).

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela B in dela C. Časa za reševanje je 90 minut. Priporočamo vam, da za reševanje dela B porabite 45 minut, za reševanje dela C pa 45 minut.

Izpitna pola vsebuje 6 krajših strukturiranih nalog v delu B in 2 strukturirani nalogi v delu C. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 60, od tega 40 v delu B in 20 v delu C. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate s standardno zbirko zahtevnejših formul na straneh 3 in 4.

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v za to predvideni prostor **znotraj okvirja**. Rišete lahko tudi s svinčnikom. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Strani 17 in 22 sta rezervni; uporabite ju le, če vam zmanjka prostora. Jasno označite, katere naloge ste reševali na teh straneh. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

ÚTMUTATÓ A JELÖLTNEK

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!

Ne lapozzon, és ne kezdjen a feladatok megoldásába, amíg azt a felügyelő tanár nem engedélyezi!

E feladatlap megoldása során számológép nem alkalmazható.

Ragassza vagy írja be kódszámát (az első oldal jobb felső sarkában levő keretbe)!

A feladatlap két részből áll, a B és a C részből. A megoldásukra 90 perc áll a rendelkezésére. Azt javasoljuk, hogy a B részre 45 percet, a C részre 45 percet fordítson!

A feladatlap 6 rövidebb strukturált feladatot tartalmaz a B részben és 2 strukturált feladatot a C részben. Összesen 60 pontot érhet el, ebből 40-et a B, és 20-at a C részben. A feladatlapban a feladatok mellett feltüntetettük az elérhető pontszámot is. A feladatok megoldásakor használhatja a 5. és 6. oldalon található standard képletgyűjteményt.

Válaszait töltőtollal vagy golyóstollal írja a feladatlap erre kijelölt helyére, **a kereten belülre!** Rajzoláshoz használhat ceruzát is. Ha tévedett, a leírtat húzza át, majd választát írja le újra! Az olvashatatlan megoldásokat és a nem egyértelmű javításokat 0 ponttal értékeljük. A 17. és 22. oldal tartalék; ide csak akkor írjon, ha elfogy a helye. Egyértelműen jelölje meg, melyik feladatok megoldását írta erre az oldalra! A piszkozati lapokra készített vázlatokat az értékelés során nem vesszük figyelembe.

A válasznak tartalmaznia kell a megoldásig vezető műveletsort az összes köztes számítással és következtetéssel együtt. Ha a feladatot többféleképpen oldotta meg, egyértelműen jelölje, melyik megoldást értékelje az értékelő tanár!

Bízzon önmagában és képességeiben! Eredményes munkát kívánunk!



Formule

(Vsota in razlika potenc z naravnim eksponentom) Za poljubna $a, b \in \mathbb{R}$ in za poljubno naravno število n velja

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a+b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + a^{2n-2}b^2 - \dots + a^2b^{2n-2} - ab^{2n-1} + b^{2n}),$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

(Evklidov in višinski izrek) Pravokotni trikotnik ima kateti a in b ter hipotenuzo c . Višina na hipotenuzo je v_c , pravokotna projekcija katete a na hipotenuzo je a_1 , pravokotna projekcija katete b na hipotenuzo pa b_1 . Tedaj velja $a^2 = ca_1$, $b^2 = cb_1$, $v_c^2 = a_1b_1$.

(Polmera trikotniku včrtanega in očrtanega kroga) Trikotnik ima stranice a, b in c , polovica obsega je $s = \frac{a+b+c}{2}$, ploščina je S , polmer danemu trikotniku včrtanega kroga je r in polmer danemu trikotniku očrtanega kroga je R . Tedaj je $r = \frac{S}{s}$ in $R = \frac{abc}{4S}$.

(Heronova formula) Trikotnik ima stranice a, b in c , polovica obsega je $s = \frac{a+b+c}{2}$. Tedaj je njegova ploščina $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$.

(Ploščina trikotnika) Naj bodo $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ in $C(x_3, y_3)$ točke v ravnini. Ploščina trikotnika z oglišči A, B in C je enaka $S = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|$.

(Krogla) Površina in prostornina krogle s polmerom r sta $P = 4\pi r^2$, $V = \frac{4\pi r^3}{3}$.

(Razdalja točke od premice) Naj bodo $a, b, c, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ in naj a in b ne bosta oba enaka 0. Razdalja točke $T_0(x_0, y_0)$ od premice p , podane z enačbo $ax + by - c = 0$, je

$$d(T_0, p) = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

(Logaritem) Naj bosta $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$. Tedaj za vsak $x > 0$ velja $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

(Adicijski izreki) Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y, \quad \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y.$$

Za poljubna $x, y \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k; k \in \mathbb{Z} \right\}$, za katera je $x + y \neq \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k$ za poljuben $k \in \mathbb{Z}$ in

$$\tan x \tan y \neq -1, \text{ velja } \tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}.$$

(Kotne funkcije polovičnih kotov) Za poljuben $x \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \quad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}.$$

$$\text{Za poljuben } x \in \mathbb{R} \setminus \{ \pi + \pi \cdot 2k; k \in \mathbb{Z} \} \text{ velja } \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}.$$

(Faktorizacija vsote in razlike kotnih funkcij) Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cos \frac{x \mp y}{2},$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2},$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$$



(Razčlenitev produkta kotnih funkcij) Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}(\cos(x+y) - \cos(x-y)),$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y)),$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)).$$

(Elipsa) Elipsa v ravnini ima polosi a in b ($a > b$), njena linearna ekscentričnost je e , njena numerična ekscentričnost je ε . Tedaj velja $e^2 = a^2 - b^2$, $\varepsilon = \frac{c}{a}$.

(Hiperbola) Hiperbola v ravnini ima realno polos a in imaginarno polos b , njena linearna ekscentričnost je e , njena numerična ekscentričnost je ε . Tedaj velja $e^2 = a^2 + b^2$, $\varepsilon = \frac{c}{a}$.

(Parabola) Parabola v ravnini z enačbo $y^2 = 2px$ ima gorišče v $G\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, enačba premice vodnice dane parabole pa je $x = -\frac{p}{2}$.

(Aritmetično zaporedje) Vsota prvih n členov aritmetičnega zaporedja (a_n) je $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$.

(Geometrijsko zaporedje) Vsota prvih n členov geometrijskega zaporedja (a_n) s kvocientom $q \in \mathbb{R}$ je $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$, če je $q \neq 1$, in $S_n = na_1$, če je $q = 1$.

(Limiti) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ in $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

(Nedoločeni integral) Naj bo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tedaj je za vsak $C \in \mathbb{R}$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad \text{in} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C.$$

(Integracija po delih) Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$ in $u, v : D \rightarrow \mathbb{R}$ odvedljivi funkciji. Tedaj velja

$$\int u \cdot v' = u \cdot v - \int v \cdot u'.$$

(Volumen rotacijskega telesa) Naj bo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Volumen telesa, ki ga dobimo tako, da lik, ki ga omejujejo graf funkcije f , abscisna os ter premici $x = a$ in $x = b$, zavrtimo okrog abscisne osi za 360° , je $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

(Bernoullijeva formula) Naj bo p verjetnost, da se v danem poskusu zgodi dogodek A . Verjetnost, da se dogodek A v n zaporednih ponovitvah poskusa zgodi natanko k -krat, je

$$P(n, p, k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

**Képletek**

(A természetes kitevőjű hatványok összege és különbsége) Tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$ és tetszőleges n természetes számra fennáll

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a+b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + a^{2n-2}b^2 - \dots + a^2b^{2n-2} - ab^{2n-1} + b^{2n}).$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

(Euklidesz-tétel (befogótétel) és a magasságtétel) A derékszögű háromszög befogói a és b , az átfogója c . Az átfogóhoz tartozó magasság v_c , az a befogó merőleges vetülete az átfogóra

$$a_1, a \text{ befogó merőleges vetülete az átfogóra } b_1. \text{ Ekkor fennáll: } \boxed{a^2 = ca_1, b^2 = cb_1, v_c^2 = a_1b_1}.$$

(A háromszög beírt és körülírt körének sugara) A háromszög oldalai a, b és c , a félkerület

$$s = \frac{a+b+c}{2}, a \text{ területe } S, \text{ az adott háromszög bert körének sugara } r \text{ és az adott háromszög}$$

$$\text{körelírt körének sugara } R. \text{ Ekkor fennáll: } \boxed{r = \frac{S}{s}} \text{ és } \boxed{R = \frac{abc}{4S}}.$$

(Héron-képlet) A háromszög oldalai a, b és c , a félkerület $s = \frac{a+b+c}{2}$. Ekkor a területe

$$\boxed{S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}.$$

(A háromszög területe) Legyenek az $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ és $C(x_3, y_3)$ síkbeli pontok. Az A, B

$$\text{és } C \text{ csúcsú háromszög területe: } \boxed{S = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|}.$$

(Gömb) Az r sugarú gömb felszíne és térfogata $\boxed{P = 4\pi r^2, V = \frac{4\pi r^3}{3}}$.

(Pont és egyenes távolsága) Legyenek $a, b, c, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ és a és b ne legyenek egyenlők 0-val.

$A(T_0(x_0, y_0))$ pont távolsága az $ax + by - c = 0$ egyenletű p egyenestől

$$\boxed{d(T_0, p) = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}}.$$

(Logaritmus) Legyenek $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$. Akkor minden $x > 0$ -re fennáll $\boxed{\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}}$.

(Addíciós tételek) Tetszőleges $x, y \in \mathbb{R}$ esetén fennáll

$$\boxed{\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y, \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y}.$$

Tetszőleges $x, y \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k; k \in \mathbb{Z} \right\}$, amelyre $x + y \neq \frac{\pi}{2} + \pi \cdot k$ tetszőleges $k \in \mathbb{Z}$ és

$$\tan x \tan y \neq -1, \text{ fennáll } \boxed{\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}}.$$

(A félszögek szögfüggvényei) Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén fennáll

$$\boxed{\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}}.$$

$$\text{Tetszőleges } x \in \mathbb{R} \setminus \{ \pi + \pi \cdot 2k; k \in \mathbb{Z} \} \text{ esetén fennáll } \boxed{\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}}.$$

(Összegek szorzattá alakítása) Tetszőleges $x, y \in \mathbb{R}$ esetén fennáll

$$\boxed{\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cos \frac{x \mp y}{2}},$$

$$\boxed{\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}},$$

$$\boxed{\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}}.$$



(A szorzatok összeggé alakítása) Tetszőleges $x, y \in \mathbb{R}$ esetén fennáll

$$\sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}(\cos(x+y) - \cos(x-y)),$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y)),$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)).$$

(Ellipszis) A síkbeli ellipszis féltengelyei a és b ($a > b$), a lineáris excentricitása e , a numerikus excentricitása ε . Ekkor fennáll: $e^2 = a^2 - b^2$, $\varepsilon = \frac{e}{a}$.

(Hiperbola) A síkbeli hiperbola valós féltengelye a , képzetes féltengelye b , a lineáris excentricitása e , a numerikus excentricitása ε . Ekkor fennáll: $e^2 = a^2 + b^2$, $\varepsilon = \frac{e}{a}$.

(Parabola) Az $y^2 = 2px$ egyenletű síkbeli parabola $G\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ fókuszponttal, az adott parabola vezéregyenesének egyenlete $x = -\frac{p}{2}$.

(Számítási sorozat) Az (a_n) számtani sorozat első n elemének összege $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$.

(Mértani sorozat) A $q \in \mathbb{R}$ hányadosú (a_n) mértani sorozat első n elemének összege

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}, \text{ ha } q \neq 1, \text{ és } S_n = na_1, \text{ ha } q = 1.$$

(Határértékek) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ és $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

(Határozatlan integrál) Legyen $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ekkor minden $C \in \mathbb{R}$ esetén fennáll

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \text{ és } \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.$$

(Parciális integrálás) Legyen $D \subseteq \mathbb{R}$ és $u, v : D \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvény. Ekkor fennáll:

$$\int u \cdot v' = u \cdot v - \int v \cdot u'.$$

(Forgástest térfogata) Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Annak a testnek a térfogata, amelyet úgy kapunk, hogy az f függvény grafikonja, az abszcissa tengely és az $x = a$ és $x = b$ egyenesek által határolt síkidomot az abszcissa tengely körül 360° -kal megforgatunk, egyenlő lesz $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

(Bernoulli-képlet) Legyen p valószínűségű, hogy egy adott kísérletben bekövetkezik az A esemény. Annak valószínűsége, hogy az A esemény a kísérlet n egymást követő megismétlésénél pontosan k -szor következik be

$$P(n, p, k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!



Konceptni list / *Piszkozati lap*

**Konceptni list / *Piszkozati lap***

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!



Konceptni list / *Piszkozati lap*

**Konceptni list / *Piszkozati lap***



M 2 4 1 4 0 2 1 1 M 1 1

B) KRAJŠE STRUKTURIRANE NALOGE / RÖVIDEBB STRUKTURÁLT FELADATOK

1. Dana je funkcija s predpisom $f(x) = -3x + 5$. Izračunajte $f\left(-\frac{1}{2}\right)$. Izračunajte, za kateri x je vrednost te funkcije $\frac{11}{2}$. Za katere x so vrednosti funkcije negativne?

Adott az $f(x) = -3x + 5$ hozzárendelési szabályú függvény. Számítsa ki az $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ értéket!

Számítsa ki, melyik x esetén lesz a függvény helyettesítési értéke $\frac{11}{2}$! Melyik x esetén lesz a függvény értéke negatív?

(8 točk/pont)



2. Krogu s polmerom 3 včrtamo pravilni šestkotnik. Natančno izračunajte obseg in ploščino šestkotnika.

A 3 sugarú körbe szabályos hatszöget írunk. Számítsa ki a hatszög kerületének és területének pontos értékét!

(6 točk/pont)



3. Razstavite izraze:
Alakítsa szorzattá a következő kifejezéseket:

$$x^2 - 49$$

$$2x^2 - 2x - 12$$

$$x^3 + 3x^2 - 4$$

(6 točk/pont)



4. Elipsa s središčem v izhodišču koordinatnega sistema ima dve temeni $T_1(2, 0)$ in $T_2(-2, 0)$ ter poteka skozi točko $A\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. Zapišite njeno enačbo in drugi dve temeni.

Az origó középpontú ellipszisnek két csúcspontja: $T_1(2, 0)$ és $T_2(-2, 0)$, és áthalad az $A\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ponton. Írja fel az egyenletét és a másik két csúcspontját!

(7 točk/pont)



5. Naj bo $f(x) = a \cdot e^x + b$. Tangenta na graf funkcije f v točki z absciso $x=0$ ima enačbo $y=2x+1$. Izračunajte vrednosti realnih števil a in b .

Legyen $f(x) = a \cdot e^x + b$. Az f függvény grafikonjához húzható érintő egyenlete az $x=0$ abszcisszájú pontban $y=2x+1$. Számítsa ki az a és b valós számok értékét!

(7 točk/pont)



6. Določite definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije $f(x) = \log_2(x^2 + x - 6)$.

Határozza meg az $f(x) = \log_2(x^2 + x - 6)$ függvény értelmezési tartományát és értékkészletét!

(6 točk/pont)

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!



Rezervna stran / *Tartalék oldal*

OBRNITE LIST.
LAPOZZON!



C) STRUKTURIRANE NALOGE / *STRUKTURÁLT FELADATOK*

1. Rešite spodnji nalogi. / *Oldja meg a következő feladatokat!*


1.1. V kompleksni ravnini narišite množico A vseh kompleksnih števil z , ki zadoščajo pogoja $-2 \leq \operatorname{Re} z \leq 2$ in $1 \leq \operatorname{Im} z \leq 3$.

Zapišite w in $\bar{w}$, kjer je točka w težišče lika, ki ga določa množica A .

Katera je največja vrednost $|z|$, ki jo lahko zavzame število $z \in A$? Pri katerih $z \in A$ je dosežena ta vrednost?

Ábrázolja a komplex számsíkban azt a z komplex számokat tartalmazó A halmazt, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: $-2 \leq \operatorname{Re} z \leq 2$ és $1 \leq \operatorname{Im} z \leq 3$!

Írja fel a w és $\bar{w}$ értékeket, ahol a w az A halmaz által meghatározott síkidom súlypontja. Mekkora lehet a $z \in A$ szám esetén a $|z|$ legnagyobb értéke? Melyik $z \in A$ esetén lesz a legnagyobb ez az érték?



(4 točke/pont)



- 1.2. V kompleksni ravnini narišite množico B vseh kompleksnih števil z , ki zadoščajo pogoju $|z - 5 - 5i| \leq \sqrt{2}$.


Izračunajte $|u|$, kjer je u središče množice B .

Katera je najmanjša vrednost $|z|$, ki jo lahko zavzame število $z \in B$? Pri katerih $z \in B$ je dosežena ta vrednost?

Ábrázolja a komplex síkban azt a z komplex számokat tartalmazó B halmazt, amelyek megfelelnek a következő feltételnek: $|z - 5 - 5i| \leq \sqrt{2}$!

Számítsa ki az $|u|$ értékét, ahol az a B halmaz középpontja!

Mekkora lehet a $z \in B$ szám esetén a $|z|$ legkisebb értéke? Melyik $z \in B$ esetén lesz a legkisebb ez az érték?




(6 točk/pont)



2. Funkcija f je dana s predpisom $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^2 - 4}$.

Adott az $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^2 - 4}$ hozzárendelési szabállyal megadott f függvény.

- 2.1. Poiščite definicijsko območje funkcije f . Izračunajte ničle in enačbo poševne asimptote ter skicirajte njen graf (pri tem ni treba uporabljati odvoda).
Írja fel az f függvény értelmezési tartományát! Számítsa ki a zérushelyeket, a ferde aszimptotája egyenletét, továbbá készítse el a grafikonja vázlatát (nem szükséges deriválni)!



(6 točk/pont)

- 2.2. Zapišite predpis funkcije f v obliki $f(x) = p(x) + \frac{q(x)}{x^2 - 4}$, kjer sta p in q linearni funkciji.

Írja fel az f függvény hozzárendelési szabályát $f(x) = p(x) + \frac{q(x)}{x^2 - 4}$ alakban, ahol p és q lineáris függvények.

(1 točka/pont)

- 2.3. Izračunajte ploščino lika, ki leži v prvem kvadrantu in ga omejuje graf funkcije f in abscisna os.
Számítsa ki annak a síkidomnak a területét, amely az első síknegyedben van, és az f függvény grafikonja, valamint az abszcisszatengely határolja!

(3 točke/pont)





Rezervna stran / *Tartalék oldal*



Prazna stran

Üres oldal



Prazna stran

Üres oldal