



Državni izpitni center



P 2 1 2 S 3 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Torek, 31. avgust 2021

POKLICNA MATURA

Moderirana različica

1. DEL

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ C	
2	1	♦ A	
3	1	♦ D	
4	1	♦ B	
5	1	♦ A	
6	1	♦ C	
7	1	♦ B	
8	1	♦ D	
9	1	♦ B	
10	1	♦ A	
11	1	♦ C	
12	1	♦ B	
13	1	♦ D	
14	1	♦ 2, 1, 4, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
15	1	♦ 2, 3, 1, 4	Za pravilno zaporedje 1 točka.
16	1	♦ 4, 1, 2, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
17	1	♦ 3, 2, 4, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
18	1	♦ 1, 3, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
19	1	♦ 4, 3, 1, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
20	1	♦ 2, 4, 3, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
21	1	♦ 3, 1, 2, 4	Za pravilno zaporedje 1 točka.
22	1	♦ 1, 4, 2, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
23	1	♦ 4, 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
24	1	♦ 3, 1, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
25	1	♦ 5, 3, 1, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
26	1	tri od: ♦ nosnici se izraziteje širita ♦ ramena se izraziteje dvigujejo ♦ vrat je videti krajši ♦ poglobita se ključnični jamici ♦ prisotno je ugrezanje oz. »plapolanje« medrebrnih mišic ♦ dispneja / oteženo dihanje ♦ tahipneja, tahikardija ♦ občutek tesnobe pri dihanju ♦ dihanje je plitvo	
27	1	♦ popolna ohromelost ene strani oz. polovice telesa	
28	1	♦ arteria brachialis	

29	1	tri od: <ul style="list-style-type: none">♦ kljuvajoča bolečina v ušesu, dojenček pogosto z rokami sega proti ušesu♦ visoka vročina♦ odklanjanje hrane♦ razdražljivost, nemir, jok♦ izcedek iz ušesa♦ pordelelo, toplo uho♦ slabši sluh♦ izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje♦ vnete oči	
30	1	♦ 1 ml	

Skupno število točk 1. dela: 30

2. DEL

1. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ tahikardija ♦ tahipneja ♦ hipertenzija ♦ potenje ♦ razširjene zenice ♦ pacient je nemiren, negotov, razburjen, joka ♦ stalno govori o bolečini ♦ se drži za boleči predel ♦ trpeč izraz na obrazu ♦ bolečina je nenadna, intenzivna 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
1.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ pacientovo izražanje bolečine ♦ tip / lastnosti bolečine ♦ mesto bolečine ♦ intenziteto (jakost) bolečine ♦ trajanje bolečine ♦ čas, kdaj se bolečina pojavi ♦ širjenje bolečine ♦ spremembe vitalnih funkcij ♦ kaj bolečino poslabša in kaj jo omili ♦ vpliv bolečine na opravljanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti ♦ spremljajoče težave, kot so lahko nespečnost in pomanjkanje apetita ♦ pacientovo stanje zavesti in čustvene spremembe ♦ vpliv bolečine na kakovost življenja ♦ učinkovitost predpisane protibolečinske terapije 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
Skupaj	4		

2. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ primesi ♦ barvo ♦ količino ♦ vonj 	
2.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pacienta dvignemo v sedeči položaj in ga nagnemo naprej, nezavestnega in slabotnega pacienta obrnemo na bok. ♦ Pacientu z eno roko podpiramo čelo, z drugo roko pridržimo ledvičko, v katero pacient bruha. ♦ Pacientu ponudimo ledvičko in papirnate robčke na doseg rok. ♦ Pacienta pomirimo. ♦ Z izbruhano vsebino ravnamo kot s kužnino. ♦ Po naročilu zdravnika in pri zastrupitvah z okuženo hrano izbljuvek odvezamemo za toksikološko preiskavo. ♦ Opazujemo izbruhano vsebino. ♦ Po bruhanju izvedemo ustno nego, pacienta umijemo in ga preoblečemo. ♦ Pacientu pogosto ponudimo tekočino v manjših količinah (do 20 ml ali po požirkih). ♦ Merimo bilanco tekočin. ♦ Nadzorujemo vitalne funkcije, stanje zavesti in splošno počutje pacienta. ♦ Izvajamo poostren nadzor pacienta in ga opazujemo. ♦ Po naročilu zdravnika dajemo antiemetike. ♦ Prezračimo prostor. ♦ Dokumentiramo izvedene intervencije zdravstvene nege in opažanja. 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
2.3	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ aspiracija ♦ zadušitev ♦ dehidracija ♦ porušeno acidobazično in elektrolitsko ravnovesje 	
Skupaj	4		

3. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ krvavitev (zunanje in notranje krvavitve, gastrointestinalne krvavitve) ♦ opekline ♦ dehidracija ♦ izguba telesnih tekočin (bruhanje, driska) 	
3.2	2	šest od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ slabost, omotica ♦ žeja ♦ bleda, potna in hladna koža ♦ tahikardija, slabo tipljiv pulz ♦ tahipneja ♦ hipotenzija ♦ upočasnjena kapilarna polnitev ♦ nemir, agresija, anksioznost ♦ apatija, brezčutnost ♦ motnje zvesti: zmedenost, nezavest ♦ oligurija ♦ periferna cianoza (pomodrelost prstov in ustnic) 	Za šest ali pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
3.3	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pacienta namestimo na hrbet v vodoravni položaj in mu noge dvignemo za 30 cm. ♦ Pacienta namestimo na hrbet v vodoravni položaj, nog ne dvignemo pri notranjih krvavitvah, ob poškodbi glave, nog, medenice in hrbtenice. 	
Skupaj	4		

4. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Uporabimo svinčena zaščitna sredstva – svinčena oblačila (svinčeni predpasnik, svinčeni plašč, svinčene gumijaste rokavice, svinčena zaščita za ščitnico). ♦ Prostor preiskave omejuje svinčeni zid (omogoča »varen« prostor, kjer strokovnjak prek računalnika spremlja potek preiskave). ♦ Območje sevanja je označeno s piktogramom. ♦ Čim večja oddaljenost od vira sevanja (energija sevanja pada s kvadratom razdalje). ♦ Čim krajši čas izpostavljenosti sevanju. ♦ Uporaba dozimetra za nadzor prejete doze. ♦ Nosečnica ne opravlja del v področju ioniziranega sevanja. ♦ Upošteevamo »Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti«. 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
4.2	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ z izločanjem urina (prek ledvic) ♦ z odvajanjem blata ♦ z znojenjem 	
4.3	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ alergijska reakcija / anafilaktični šok ♦ pokontrastna nefropatija 	
Skupaj	4		

5. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ kašelj (v začetku suh nato produktiven) ♦ bolečina v prsih ♦ dispneja ♦ tahipneja ♦ znižana vrednost SpO₂ (pod 95 %) ♦ visoka telesna temperatura, ki jo spremlja mrzlica ♦ tahikardija ♦ pomanjkanje apetita ♦ utrujenost 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
5.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Opazujemo dihanje, merimo saturacijo in ostale vitalne funkcije. ♦ Vzdržujemo proste dihalne poti (čiščenje nosne in ustne votline, aspiracija dihal). ♦ Skrbimo za ustrezno mikroklimo v pacientovem okolju: temperatura prostora od 20 °C do 22 °C, relativna vlaga od 50 % do 60 %. ♦ Pacienta nameščamo v sedeči, polsedeči položaj. ♦ Pacienta spodbujamo k izvajanju dihalnih vaj in gibanju po navodilu zdravnika in fizioterapevta. ♦ Pacientu pomagamo pri kašljanju in izkašljevanju izmečka iz dihalnih poti, izmeček opazujemo. ♦ Po naročilu zdravnika mu apliciramo zdravila (inhalacije ...). ♦ Po naročilu zdravnika mu damo kisik. ♦ Po naročilu zdravnika odvezamemo sputum za preiskave. ♦ Vsa opažanja in izvedene intervencije zdravstvene nege zabeležimo na temperaturni list in v dokumentacijo zdravstvene nege. 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
Skupaj	4		

6. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ s spolnim stikom ♦ s krvjo ♦ z vbodom z okuženo iglo, pri tetovažah ♦ s slino ♦ z urinom ♦ z matere na plod ♦ z mlekom doječe matere 	
6.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zlatenica ♦ temen urin ♦ svetlo obarvano blato ♦ bolečine pod desnim rebrnim lokom ♦ slabši apetit ♦ slabost, bruhanje ♦ povišana telesna temperatura ♦ driska ali zaprtje ♦ glavobol ♦ utrujenost ♦ srbečica kože 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
6.3	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ciroza jeter ♦ rak jeter 	
Skupaj	4		

7. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ iskalni ♦ sesalni ♦ požiralni refleksi 	
7.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ vsebuje veliko beljakovin ♦ vsebuje protitelesa ♦ pospeši izločanje mekonija (ima blag odvajalni učinek). ♦ zmanjša tveganje za pojav fiziološke zlatenice ♦ vsebuje snovi, ki so pomembne za razvoj črevesne mikrobiote / mikroflore 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
Skupaj	3		

8. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zvišana vsebnost glukoze v krvi nad 10 mmol/l ♦ poliurija ♦ velika žeja / pitje velikih količin tekočine ♦ hujšanje ♦ povečan apetit, lakota ♦ zadah po acetonu ♦ globoko dihanje ♦ bolečine v trebuhu ♦ suha koža in sluznice ♦ srbeče spolovilo ♦ bruhanje ♦ utrujenost ♦ motnje zavesti 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
8.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ izmerimo krvni sladkor ♦ damo predpisan odmerek insulina ♦ merimo vitalne funkcije ♦ če je otrok pri zavesti, mu dajemo tekočino brez sladkorja ♦ če je nezavesten, ga namestimo v stabilni bočni položaj 	
Skupaj	3		

Skupno število točk 2. dela: 30