



Državni izpitni center



P 1 7 1 S 3 0 1 1 3

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA


NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Sreda, 7. junij 2017

POKLICNA MATURA

Moderirana različica

IZPITNA POLA 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ B	
2	1	♦ D	
3	1	♦ C	
4	1	♦ D	
5	1	♦ A	
6	1	♦ B	
7	1	♦ D	
8	1	♦ A	
9	1	♦ B	
10	1	♦ A	
11	1	♦ C	
12	1	♦ B	
13	1	♦ 2, 1, 3, 4	Za pravilno zaporedje 1 točka.
14	1	♦ 4, 1, 3, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
15	1	♦ 3, 2, 4, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
16	1	♦ 1, 4, 2, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
17	1	♦ 4, 3, 1, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
18	1	♦ 2, 4, 3, 1	Za pravilno zaporedje 1 točka.
19	1	♦ 3, 1, 2, 4	Za pravilno zaporedje 1 točka.
20	1	♦ 1, 3, 4, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
21	1	♦ 4, 2, 1, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
22	1	♦ 2, 1, 4, 3	Za pravilno zaporedje 1 točka.
23	1	♦ 3, 1, 2	Za pravilno zaporedje 1 točka.
24	1	dve od:  <ul style="list-style-type: none"> ♦ senčnična arterija na glavi (arteria temporalis) ♦ arterija na vratu (arteria carotis) 	

25	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ vaje za krepitev mišic medeničnega dna ♦ Keglove vaje 	
26	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ bledica kože ♦ rdečina kože ♦ cianoza (modrikavost) ♦ ikterus (rumeno obarvana koža) ♦ spremembe v pigmentaciji kože 	
27	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Namestimo posteljno ograjico. ♦ Opazujemo in nadziramo pacienta. ♦ Klicno napravo namestimo v doseg pacientove roke. ♦ Posteljo spustimo na najnižjo višino. ♦ Ocenimo tveganje pacienta za padec. ♦ Poskrbimo, da so kolesca postelje zavrti ... 	
28	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Amputirani palec zavijemo v sterilno gazo, damo ju v čisto PVC-vrečko in to neprepustno zavežemo. Nato jo položimo v drugo vrečko, napolnjeno s čisto hladno vodo in kockami ledu. ♦ Amputirani palec zavijemo v sterilno gazo, damo ju v čisto PVC-vrečko in to neprepustno zavežemo. Drugo vrečko napolnimo s čisto hladno vodo in kockami ledu. Obe vrečki damo v tretjo vrečko, ki jo zavežemo in označimo s podatki. 	Za popolno rešitev 1 točka.
29	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Opazujemo epiziotomijsko rano. ♦ Izvajamo redno anogenitalno nego. ♦ Skrbimo, da je rana čista, suha. ♦ Potrebno je redno menjavanje vložkov. ♦ Svetujemo ležanje na levem boku. ♦ Otročnica naj ima čisto osebno perilo. ♦ Otročnica naj redno izvaja higieno rok. ♦ Priporočamo sedenje na napihljivem obroču. ♦ Damo analgetike po naročilu zdravnika ... 	
30	1	♦ 0,6 ml zdravila	

Skupno število točk IP 1: 30

IZPITNA POLA 2**1. naloga**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ po vstavljanju nasogastrične sonde ♦ pred vsakim hranjenjem ♦ pred prejemom zdravil 	
1.2	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ aspiracija želodčnega soka ♦ inspekcija (pregledamo ustno votlino) ♦ avskultacija (s stetoskopom ob potisku zraka poslušamo značilen zvok v predelu epigastrija) ♦ rentgensko slikanje 	
1.3	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zamašitev nasogastrične sonde ♦ izpad nasogastrične sonde ♦ izsušitev sluznice ustne votline ♦ aspiracija želodčne vsebine v dihala ♦ infekcija s hrano ♦ gastrointestinalne težave ♦ nastanek razjede zaradi pritiska na nosni sluznici 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
Skupaj	4		


2. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pacient se prha ali izvedemo posteljno kopal z antiseptičnim milom. ♦ Pacient se obleče v čisto pižamo. ♦ Pacient izvede higieno ustne votline. ♦ Pacient odstrani zobno protezo, ki jo shranimo v označeno posodico z njegovimi podatki. ♦ Pacient odstrani ličila in nakit. ♦ S čisto posteljnino preoblečemo bolniško posteljo. ♦ Po higieni pripravi naj pacient ne zapušča bolniškega oddelka. ♦ Pripravimo (britje) operativno polje. 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
2.2	1	♦ Premedikacija je aplikacija zdravila (hipnotikov, sedativov) pacientu pred kirurškim ali zahtevnejšimi diagnostično-terapevtskimi posegi.	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
2.3	1	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pacient naj pred prejemom premedikacije izprazni mehur. ♦ Pacientu razložimo, da po prejemu premedikacije ne sme samostojno vstajati. ♦ Izvajamo nadzor in poskrbimo za varnost pacienta. ♦ Dokumentiramo aplikacijo premedikacije. ♦ Upoštevamo pravila za varno dajanje zdravil. 	
Skupaj	4		

3. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ dolgotrajno, pogostejše zdravljenje z antibiotiki ♦ dolgotrajno zdravljenje v enotah intenzivne terapije ♦ pacienti, ki imajo vstavljen stalni urinski kateter ♦ pacienti, ki imajo vstavljen arterijski ali centralni venski kateter ♦ pacienti, ki so priključeni na respirator ♦ pacienti z zmanjšano imunsko odpornostjo ♦ pacienti z obsežnimi opeklinami ♦ pacienti po večjih operativnih posegih ♦ pacienti s kronično boleznijo ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
3.2	1	♦ kontaktna izolacija	
3.3	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ higiena rok (umivanje in razkuževanje rok) ♦ pacienta namestimo v enoposteljno sobo s sanitarijami ♦ vrata bolniške sobe morajo biti zaprta in z napisom kontaktna izolacija ♦ uporabimo osebno varovalno opremo: rokavice, predpasnik ali plašč, masko ♦ uporabljamo pripomočke za enkratno uporabo ♦ pripomočki za zdravstveno nego (merilnik krvnega tlaka, termometer) se uporabljajo samo za enega pacienta ♦ pripomočke (umivalnik, vrč ...) očistimo in razkužimo takoj po uporabi ♦ redno čistimo in razkužujemo pacientovo okolico, površine in opremo ♦ pripomočke prinašamo v bolniško sobo sproti (ne delamo zalog) ♦ omejimo obiske in obiskovalce poučimo o ukrepih za preprečevanje okužbe ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
Skupaj	4		

4. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ na hrbtu ♦ trda (ravna) podlaga 	Za obe pravilni rešitvi 1 točka.
4.2	1		

4.3	1	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 5 cm/do največ 6 cm ♦ 100–120 stisov/min 	Za obe pravilni rešitvi 1 točka.
4.4	1	♦ 30 stisov : 2 vpiha	
Skupaj	4		

5. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ čisto ♦ suho ♦ nepoškodovano ♦ neporaščeno ♦ ravno površino 	
5.2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ predel kožnih gub ♦ predel sklepnih pregibov ♦ poškodovano kožo ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
5.3	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Nameščeni obliž odstranimo. ♦ Kožo očistimo. ♦ Na drugo mesto namestimo obliž s predpisanim odmerkom zdravila. ♦ Na obliž napišemo datum in uro namestitve. ♦ Lepljive površine obliža se ne smemo dotikati ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
5.4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ v zbiralnik za ostre predmete ♦ med (nenevarne) odpadke iz zdravstva ♦ med neinfektivne odpadke ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
Skupaj	4		

6. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ nenadna mišična oslabeledost, odrevenelost, omrtvičenost ali mravljinčenje, delna ohromelost (hemipareza), popolna ohromelost (hemiplegija) ♦ povešen ustni kot, iztekanje sline iz ust ♦ težave pri požiranju ♦ otežen govor in sporazumevanje ♦ motnje pisanja, računanja ♦ težave z vidom: dvojni vid, zmanjšano vidno polje, lahko slepota ♦ izguba sluha ♦ motnje ravnotežja, koordinacije ♦ motnje zavesti, nezavest ♦ glavobol ♦ otrplost tilnika, krči ♦ vrtoglavica ♦ slabost, bruhanje ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.

6.2	2	<p>štiri od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ocenimo stopnjo samooskrbe pacienta: ali vidi, sliši, uporablja slušni aparat, ali je sposoben pisanja, branja, kaj in koliko razume ♦ govorimo počasi, razumljivo ♦ uporabljamo kratke stavke ♦ z obrazom smo obrnjeni k pacientu, vzpostavimo očesni stik ♦ usklajeni besedna in nebesedna komunikacija ♦ govorne vaje ♦ uporabljamo pripomočke za sporazumevanje: govorne table, simbole ... ♦ pacienta pohvalimo že za majhne dosežke ♦ dokumentiramo opažanje, posebnosti in izvedene ukrepe zdravstvene nege pri življenjski aktivnosti komunikacija, izražanje čustev, občutkov, potreb ... 	<p>Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.</p> <p>Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.</p>
Skupaj	4		

7. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7.1	2	<p>štiri od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ stalen nadzor dojenčka ♦ nadzor pri hranjenju in pitju ♦ iz dosega otrokovih rok odstranimo vse majhne predmete, delčke igračk, ki bi jih otrok lahko pogoltnil ali vdihnil ♦ pred spanjem odstranimo vrvice, trakove, verižice ♦ nad in v posteljico ne obešamo visečih igračk ♦ dojenček naj leži brez vzglavnika ♦ plastične vrečke hranimo na mestu, ki je nedostopen otroku ♦ zaboji, večje škatle naj bodo pokrite s pokrovom ♦ pralni stroj, sušilni stroj naj ima vratca zaprta ... 	<p>Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.</p> <p>Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.</p>
7.2	1	<p>tri od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ padci ♦ utopitev ♦ opekline, oparine ♦ poškodbe (ureznine, ...) ♦ prometne nesreče ♦ zastrupitve ♦ poškodba z električnim tokom ... 	<p>Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.</p>
Skupaj	3		

8. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ kašelj (suh, dražeč kašelj, ki postane produktiven z izmečkom) ♦ dispneja (stridor) ♦ hropeče dihanje ♦ vročina ♦ bruhanje ♦ izcedek iz nosu ♦ bledica ali cianoza kože ♦ nemir otroka ♦ neješčnost ... 	Upoštevamo vsako strokovno sprejemljivo rešitev.
8.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ opazujemo in merimo vitalne funkcije ♦ merimo SpO₂ ♦ otroku dvignemo vzglavje, položaj mu večkrat menjavamo ♦ poskrbimo za primerno mikroklimo: temperatura zraka 20 °C–21 °C, vlažnost zraka 60 % ♦ za doseganje vlažnosti v sobi uporabljamo vlažilce zraka in sobo večkrat prezračimo ♦ odstranjujemo sluz iz dihalnih poti, aspiracija zgornjih dihalnih poti ♦ opazujemo kašelj ♦ vlažimo nosno sluznico s kapljicami fiziološke raztopine ♦ dajemo predpisano terapijo in inhalacije po naročilu zdravnika ♦ apliciramo kisik po naročilu zdravnika ♦ otroka oblečemo v udobna, lahka oblačila iz naravnih materialov ♦ pred hranjenjem otroku očistimo dihalno pot ♦ otroku dajemo lahko prebavljivo, vitaminsko in kalorično bogato hrano v manjših obrokih, večkrat na dan ♦ poskrbimo, da otrok popije dovolj tekočine (topli napitki) ♦ dokumentiramo izmerjene vrednosti vitalnih funkcij, odstopanja, opažanja in izvedene ukrepe zdravstvene nege 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
Skupaj	3		

Skupno število točk IP 2: 30