



Državni izpitni center



P 1 8 1 S 3 0 1 1 3

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ZDRAVSTVENA NEGA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Ponedeljek, 11. junij 2018

POKLICNA MATURA

Moderirana različica

IZPITNA POLA 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	1	♦ A	
2	1	♦ C	
3	1	♦ B	
4	1	♦ D	
5	1	♦ B	
6	1	♦ C	
7	1	♦ D	
8	1	♦ B	
9	1	♦ A	
10	1	♦ B	
11	1	♦ D	
12	1	♦ C	
13	1	♦ 3, 2, 1, 4	
14	1	♦ 1, 4, 2, 3	
15	1	♦ 4, 2, 1, 3	
16	1	♦ 2, 3, 4, 1	
17	1	♦ 2, 4, 3, 1	
18	1	♦ 4, 1, 3, 2	
19	1	♦ 1, 3, 2, 4	
20	1	♦ 2, 4, 1, 3	
21	1	♦ 3, 1, 4, 2	
22	1	♦ 3, 1, 2	
23	1	dve od: ♦ pri pacientu s kisikovo terapijo ♦ pri nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja pacienta ♦ pri dispneji ♦ pri cianozi kože (hipoksija) ♦ pri obolenjih dihal, srca ...	Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
24	1	tri od: ♦ nezadosten vnos tekočine (pomanjkljivo pitje) ♦ bruhanje ♦ driska ♦ čezmerno znojenje ♦ povišana telesna temperatura ♦ čezmerno pitje alkoholnih pijač	
25	1	ena od: ♦ tekoče ♦ kašasto	
26	1	dve od: ♦ redno obračanje pacienta v razbremenilne položaje na 2 uri, pri ogroženih na 1 uro ♦ uporaba antidekubitusne blazine ♦ uporaba pripomočkov za razbremenitev pritiska (blazine različnih velikosti)	

27	1	tri od: <ul style="list-style-type: none">♦ pretirano izpadanje las♦ srbeče lasišče♦ lišaji, rane na lasišču♦ pojav prhljaja♦ pojav uši♦ mastni lasje ...	
28	1	♦ v polsedeči položaj (z nogami, spuščeni navzdol)	
29	1	tri od: <ul style="list-style-type: none">♦ ob pojavu močnih bolečin v trebuhu, hrbtenici ali medenici♦ ob pojavu močnih bolečin v mečih♦ pri krvavitvi iz nožnice♦ oteženem dihanju♦ omotici♦ slabosti♦ pri močnem glavobolu ...	
30	1	♦ 0,2 ml	

Skupno število točk IP 1: 30

IZPITNA POLA 2

1. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	1	♦ prvo stopnjo razjede zaradi pritiska	
1.2	2	štiri od: ♦ izvajanje dihalnih vaj ♦ razgibavanje v postelji (aktivno, pasivno) ♦ redno spreminjanje položajev in lege pacienta ♦ skrb za ustrezno hidracijo (pacientu ponudimo dovolj tekočine) ♦ skrb za primerno mikroklimo v prostoru, vlažnost zraka 40 % – 60 %, temperatura prostora 20 °C – 22 °C ♦ merjenje vitalnih funkcij, opazovanje pacienta ♦ vibromasaže, inhalacije ♦ pomoč pri izkašljevanju ...	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
1.3	1	tri od: ♦ zatilje ♦ lopatici ♦ trtica ♦ sednica ♦ konice prstov, zaradi pritiska odeje ♦ peti	
Skupaj	4		

2. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	2	pet od: ♦ ohranjamo zdrave zobe in dlesni ♦ vzdržujemo čisto, nepoškodovano in vlažno sluznico ustne votline ♦ odstranjujemo ostanke hrane in zobnih oblog ♦ osvežimo usta ♦ omogočamo dobro počutje pacienta ♦ preprečujemo vnetja/infekcije ustne votline ♦ preprečujemo nastanek pljučnice ♦ preprečujemo nastanek zobne gnilobe ♦ preprečujemo nastanek zobnih oblog ♦ preprečujemo nastanek oblog na sluznici ustne votline ♦ preprečujemo slab zadah iz ust (halitozo) ♦ ohranjamo zdravo in nemoteno prehranjevanje ...	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.

2.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ pri povišani telesni temperaturi ♦ pri nezavesti ♦ pri pomanjkanju slin ♦ pri spremembah v ustni votlini ♦ pri motnjah požiranja ♦ pri pacientih, ki dihajo skozi usta ♦ pri dehidraciji ♦ pri bruhanju ♦ pri hranjenju po nazogastrični sondi/ gastrostomi/jejunostomi/parenteralno hranjenje ♦ pri terapevtskih posegih v ustni votlini (operacija) ♦ pri nekaterih zdravilih (citostatiki, bronhodilatatorji, antibiotiki, imunosupresivi ...) ♦ pri obsevanju glave in predela vratu ♦ pri pacientih s traheostomo, intubiranih pacientih ♦ pri umirajočih pacientih ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
Skupaj	4		

3. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zadušitve ♦ zapore dihalne poti ♦ aspiracija izbruhane vsebine ali krvi v pljuča 	
3.2	1	♦ Zenici se ne odzivata na svetlobo.	
3.3	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Poskrbimo za varnost. ♦ Ocenimo odzivnost pacienta. ♦ Pacientu sprostimo dihalno pot ter preverimo dihanje in krvni obtok. ♦ Kadar pacient diha in se ne odziva, ga namestimo v stabilni bočni položaj. ♦ Pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. ♦ Do prihoda ekipe NMP nadzorujemo pacienta in mu merimo vitalne funkcije. ♦ Poskrbimo za ustrezen prevoz pacienta v bolnišnico. ♦ Ob prenehanju dihanja in bitja srca začnemo izvajati postopke kardiopulmonalnega oživljanja. 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka. Če med pravilnimi rešitvami nista navedeni rešitvi v krepkem tisku, 0 točk.
Skupaj	4		

4. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Odvajanje krvi/gnoja/druge telesne tekočine/ zraka po drenažni cevki. ♦ Boljše celjenje rane. ♦ Preprečuje okužbo. 	Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
4.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ količino in videz izločene drenažne vsebine ♦ prehodnost/pretok drenažne cevke ♦ vstopno mesto in kožo v okolici drenažne cevke ♦ prepojenost obveze z izločkom ♦ merimo bilanco tekočin ♦ merimo vitalne funkcije, pojav bolečine ♦ opazujemo pacientovo splošno počutje in vpliv drenaže na izvajanje aktivnosti ♦ prepoznavamo mogoče zaplete (infekcija, krvavitev, vraščanje drenažne cevke v okolno tkivo) 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
4.3	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ infekcija ♦ krvavitev ♦ zamašitev drenažne cevke ♦ izpad drenažne cevke ♦ vraščanje drenažne cevke v okolno tkivo 	
Skupaj	4		

5. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	1	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ bolečina (začetna v okolici popka ali pod žličko, ki se širi v spodnji desni del trebuha) ♦ slabost/navzea ♦ bruhanje ♦ povišana telesna temperatura (rektalna telesna temperatura je za 1 °C višja od aksilarne) 	
5.2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ perforacija/predrtje ♦ peritonitis ♦ tvorba abscesa 	
5.3	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Opazujemo splošno počutje pacienta in mu merimo vitalne funkcije. ♦ Opazujemo in oskrbimo kirurško rano ter drenažo. ♦ Dajemo predpisana zdravila po naročilu zdravnika. ♦ Poskrbimo za zadosten vnos tekočine (nesladkan čaj, voda). ♦ Pacient zaužije lahko prebavljivo hrano. ♦ Poskrbimo za zgodnje vstajanje. ♦ Nadzorujemo izločanje in odvajanje. ♦ Po naročilu zdravnika vstavimo črevesno cevko, apliciramo klizmo. ♦ Dokumentiramo izvedene ukrepe, zmerjene vrednosti, spremembe. 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
Skupaj	4		

6. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6.1	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ motnje orientacije ♦ slušne, vidne halucinacije ♦ preganjalne blodnje ♦ motnje pozornosti ♦ motnje spomina ♦ nespečnost/obrnjen ritem spanja (zamenjava dneva in noči) ♦ tremor ♦ nemir ♦ agresivnost ♦ bledica ali rdečica kože ♦ znojenje ♦ tahikardija ♦ hipertenzija ♦ bruhanje ♦ hipertermija ♦ inkontinenca 	Za pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.
6.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Opazujemo pacientove navade, spremembe in motnje pri hranjenju in pitju. ♦ Poskrbimo za zadosten vnos tekočine. ♦ Merimo bilanco tekočin. ♦ Glede na pacientovo zdravstveno stanje poskrbimo za ustrezno kalorično in beljakovinsko bogato prehrano, pri čemer upoštevamo dietne omejitve. ♦ Nadzorujemo telesno maso pacienta. ♦ Dajemo zdravila po zdravnikovem naročilu. ♦ Dokumentiramo izvedene intervencije (ukrepe), izmerjene vrednosti, spremembe, odstopanja. 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka.
Skupaj	4		

7. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ v hladilniku (do 4 °C do 48 ur) ♦ ga globoko zamrznemo (hranimo do 3 mesece) 	
7.2	2	štiri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Maternica se po porodu hitreje krči (zaradi izločanja hormona oksitocina). ♦ Zmanjšuje poporodno krvavitev. ♦ Z dojenjem mati laže izgubi čezmerno telesno maso. ♦ Je enostaven in najcenejši način prehranjevanja otroka. ♦ Mati okrepi samopodobo, je pomirjena, zadovoljna. ♦ Polno dojenje je naravna oblika kontracepcije (zavira ovulacijo). ♦ Zmanjša možnost obolenja raka dojke in jajčnikov. 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
Skupaj	3		

8. naloga

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8.1	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Psihični hospitalizem je duševna in čustvena prizadetost otroka zaradi hospitalizacije. ♦ Čustveni odziv otroka na sprejem v bolnišnico, ki se kaže v spremenjenem vedenju. 	Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
8.2	2	pet od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Otrok je nemiren. ♦ Protestira. ♦ Ne jé. ♦ Ne spi. ♦ Joka. ♦ Ima negativen odnos do zdravstvenega osebja. ♦ Ponovno moči posteljo. ♦ Grize nohte. ♦ Je žalosten, potr, brez volje. ♦ Nima želja. ♦ Je nezaupljiv. ♦ Se ne pogovarja, zapre se v svoj svet ... 	Za pet pravilnih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka. Upoštevamo vsako strokovno pravilno rešitev.
Skupaj	3		

Skupno število točk IP 2: 30